

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 17-12-22-02-0237 din 22.12.2017

FORMA PREPARATIVĂ:

granulele dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE:

clasa de pericolozitate – III/III

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Magnat 75 WG este absorbit de părțile aeriene ale plantei și distribuit acropetal în interiorul țesuturilor, unde blochează extinderea ciupercii prin inhibarea procesului de sinteză a ergosterolilor ceea ce duce la incapacitatea ciupercii de a-și forma perete celular.


AVANTAJE:

- Fungicid sistemic cu acțiune protectivă, curativă și eradicativă.
- Odată pătruns în plantă este translocat prin xilem în toate organele verzi ale plantei, inclusiv în lăstarii apăruiți după aplicarea tratamentului.
- Poate fi aplicat în toate fazele de dezvoltare a plantei, în condiții extreme se pot face tratamente chiar și în timpul înfloritului fără a afecta polenizarea și calitatea fructelor.
- Stabil la precipitațiile atmosferice.

- „Stop-efect” pronunțat.
- Spectru larg de acțiune și eficacitate biologică înaltă.
- Inofensiv pentru albi.

COMPATIBILITATEA:

Produsul poate fi utilizat în amestec cu majoritatea fungicidelor, insecticidelor și îngrășămintelor foliare, cu excepția celor cu reacție alcalină, acide și oxidante. Pentru o mai mare siguranță se va consulta lista de compatibilitate și se va face un test.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

| Cultura | Organismul nociv | Norma de consum a produsului (kg/ha) | Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente) | Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate) |
|----------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| Măr | Făinarea | 0,25 - 0,3 | 35 (2-3) | 7 (3) |
| Vița de vie | Făinarea viței de vie | | | |
| Prun | Clasterosporioza Pătarea roșie a frunzelor Monilioze | | | |
| Cireș, vișin | Clasterosporioză; Cocomicoză; Monilioză | 0,3 - 0,4 | 20 (2-3) | - |
| Grâu | Helmintosporioze; Făinare | | 35 (1) | |
| Rapiță | Alternarioza; Fomoza Putregai alb | *În proces de omologare | 56 (1-2) | |
| Piersic ■, cais ■ | Clasterosporioza Făinarea | | | |

Norma de consum a soluției de lucru: livezi: 1000-1500 l/ha;
vița de vie: 600-800 l/ha;
grâu, rapiță: 200-400 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- De folosit un volum necesar de soluție astfel încât să se asigure o acoperire uniformă a întregului foliaj și a părților mai puțin expuse ale butucilor de vie (mai ales partea inferioară și ciorchinii).
- Tratamentele se aplică preventiv sau la apariția primelor semne de infecție, intervalul între tratamente 7-10 zile.



FUNGICIDE