

 **Mospelat® 20 SL****INSECTICID****SUBSTANȚA ACTIVĂ:** acetamiprid 200g/l**CERTIFICAT DE OMOLOGARE:**  
**Nr. 20-06-11-01-0692 din 11.06.2020****FORMA PREPARATIVĂ:**  
concentrant solubil (SL)**TOXICITATE:**  
clasa de pericolozitate – III/III**MECANISMUL DE ACȚIUNE:**

**Mospelat 20 SL** este un insecticid sistemic, pe bază de acetamiprid, din grupa produselor neonicotinoide. Acetamiprid acționează asupra sistemului nervos central, interferând în transmiterea impulsurilor nervoase.

**AVANTAJE:**

- Este un insecticid sistemic, unic cu o excelență activitate translaminară.
- Formularea lichidă, foarte performantă și ușor de utilizat.
- Controlează un spectru larg de dăunători - rozători și sugători.
- Substanța activă a produsului are un efect knock-down.
- Prezintă o acțiune rapidă, provocând în scurt timp după administrare, paraliza și moartea insectei.
- Insectele sunt controlate de pe ambele fețe ale frunzei.
- Nu este afectat de temperatură, stabil în contactul cu razele solare.
- După aplicare, pătrunde translaminar în plante și nu este spălat de ploi sau apa de irigare.

- Non-fitotoxic pentru plantele cultivate.

**COMPATIBILITATEA:**

- Este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar sau fertilizanți, făcând excepție cele cu reacție alcalină (ex. Zeama Bordelează) și uleiuri minerale. Pentru o folosire corectă trebuie verificat compatibilitatea produselor care se vor amesteca.

**TEHNICA DE APLICARE:**

- Trebuie aplicat la dozele recomandate, în perioada de eclozare a primelor larve;
- Nu pulverizați în condiții de vânt;
- Nu aplicați înainte de 2-4 ore de ploaie;
- Produsul se aplică prin stropire cu echipamente terestre cu volumul necesar de soluție, astfel încât să se asigure o acoperire uniformă a întregului foliaj, dar nu mai mult de punctul de scurgere al soluției.

## RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

| Cultura      | Organismul nociv                                                                                           | Norma de consum a produsului (l/ha) | Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente) | Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Măr          | Viermele merelor; Molii tortricide; Păduchele verde al mărlui                                              | 0,3 - 0,45                          | 28 (2-3)                                                                 |                                                                              |
| Prun         | Viespi; Viespea semintelor de prun; Păduchele cenușiu al prunului; Viermele prunelor                       |                                     | 28 (2)                                                                   |                                                                              |
| Cartof       | Gândacul din Colorado                                                                                      | 0,25                                | 7 (2-3)                                                                  | 7 (3)                                                                        |
| Cireș, vișin | Musca cireșelor; Păduchele negru al cireșului                                                              |                                     | 14 (2)                                                                   |                                                                              |
| Cais         | Molia orientală a fructelor; Păduchele verde al piersicului                                                | 0,25 - 0,3                          | 14 (2)                                                                   | - (3)                                                                        |
| Rapiță       | Gândacul lucios al rapiței; Gărgărița tulpinilor de varză; Paduchele cenușiu al verzei; Țânțărașul rapiței | 0,25 - 0,3                          | 28 (2)                                                                   |                                                                              |
| Grâu         | Tripsul grâului; Păduchele verde al cerealelor; Gândacul ovăzului; Ploșnițe                                | 0,25                                | 45 (1)                                                                   |                                                                              |
| Piersic      | Molia orientală a fructelor; Păduchele verde al piersicului                                                |                                     | *În proces de omologare                                                  |                                                                              |
| Vița de vie  | Moliile viței de vie; Cicorițe                                                                             |                                     |                                                                          |                                                                              |
| Tomate       | Păduchi; Buha fructificațiilor                                                                             |                                     |                                                                          |                                                                              |
| Varză        | Puricele negru al verzei; Puricele albastru al verzei; Păduchele cenușiu al verzei; Buha verzei            |                                     |                                                                          |                                                                              |

Norma de consum a soluției de lucru: livezi: 1000-1500 l/ha;

vița de vie: 800-1000 l/ha;

legume și culturi de câmp: 300-400 l/ha.

