

 **Stroly**® 50 WG



**FUNGICID**

**SUBSTANȚA ACTIVĂ:** kresoxim-metil 500 g/kg

**FORMA PREPARATIVĂ:**

granulele dispersabile în apă (WG)

**TOXICITATE:**

clasa de pericolozitate – IV/IV

**CERTIFICAT DE OMOLOGARE:**

Nr. 20-12-17-02-0853 din 17.12.2020

### **MECANISMUL DE ACȚIUNE:**

**Stroly 50 WG** este un fungicid sistemic pe bază de kresoxim-metil, din familia strobilurinelor. Substanța activă, kresoxim-metil, este absorbită de suprafața foliară și translocată prin xilem în tot corpul plantei. Kresoxim-metil-ul inhibă respirația mitocondrială a fungilor, germinația sporilor, creșterea miceliului și producerea sporilor.

### **AVANTAJE:**

- Acțiune sistemică, preventivă și curativă contra patogenilor.
- Distribuție uniformă pe toată suprafața.
- Intensifică fotosinteza (efect colateral).
- Substanța activă rămâne după aplicare la suprafața frunzelor ca un depozit solid, particulele fiind absorbite în stratul subcuticular.





**NOTĂ:** *Stroly 50 WG se aplică preventiv. În cadrul tratamentelor în bloc se aplică maxim 2 stropiri consecutive. Aplicarea strobilurinelor trebuie să alterneze cu stropiri cu produse din alte grupe. Pentru o eficacitate mai bună se recomandă de a aplica un tratament combinat Stroly 50 WG (cu efect uni-site) + Kapton 80 WG (cu efect multi-site).*

## RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

| Cultura | Organismul nociv | Norma de consum a produsului (kg/ha) | Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente) | Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate) |
|---------|------------------|--------------------------------------|--|--|
| Măr     | Rapănul mărului  | 0,25 - 0,3                           | 35 (3)   | 7 (3)  |

Norma de consum a soluției de lucru: 800-1000 l/ha.

- Eliberarea substanței active se face treptat, fapt ce conferă o lungă perioadă de acțiune.
- Poate fi aplicat fără riscuri de fitotoxicitate, având o selectivitate excelentă.
- Inofensiv pentru albiși și entomofauna utilă.
- Compatibil cu majoritatea fungicidelor, insecticidelor și cu fertilizanții.

## TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt sau înainte de 2-4 ore de ploaie.
- Se va asigura o pulverizare fină și uniformă a foliajului până la punctul de scurgere a soluției.
- Se aplică la măr începând cu fenofaza de buton roz, până la începutul fructificării (fructe de mărimea nucilor).
- Asigurați funcționarea agitatorului pe toată durata tratamentului.



FUNGICIDE