

Miuris® 125 EC



ERBICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: quizalofop-P-etil 125 g/l

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 23-11-28-03-1461 din 28.11.2023

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Miuris 125 EC este un erbicid cu acțiune sistemică, selectiv. Substanța activă a erbicidului este rapid absorbită de frunze și alte părți aeriene ale buruienilor monocotiledonate. Ulterior se translocă în toate punctele de creștere intensă, inclusiv în rădăcini și rizomi, unde distruge lipidele din celulele meristematice. Erbicidul nu pătrunde în sol și nu are nici un efect asupra buruienilor care apar după tratament.

AVANTAJE:

- Este selectiv pentru culturile cu frunza lată.
- Nici o limitare privind etapele de dezvoltare a culturilor în timp de aplicare a produsului.



FORMA PREPARATIVĂ:

concentrat emulsionabil (EC)

TOXICITATE:

clasa de pericolozitate – IV/IV

- Eficiență înaltă contra samurasei de cereale păioase.
- Protecția durează până la sfârșitul perioadei de vegetație.

RAPIDITATE DE ACȚIUNE:

- Primele simptome de suprimare a buruienilor apare la 7-10 zile. Buruienile tratate își încetează creșterea, frunzele tinere capătă o nuanță gălbuie. Distrugerea completă apare la 1-3 săptămâni după tratare, în funcție de tipurile de buruieni și de condițiile climatice. Cultivarea ar trebui să fie evitată timp de 2-3 săptămâni după tratament.
- Ploile survenite până la 2 ore de la tratament diminuează eficacitatea erbicidului.



ATENȚIE!

Nu se recomandă amestecuri cu erbicide împotriva buruienilor dicotiledonate la culturile date.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Floarea soarelui	Buruieni monocotiledonate anuale	0,6	- (1)	7 (3)
	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,2		
Soia	Buruieni monocotiledonate anuale	0,6	- (1)	7 (3)
	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,0		
Rapița	Buruieni monocotiledonate anuale	0,6	- (1)	- (3)
	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,0		

Norma de consum a soluției de lucru: 200-400 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Se aplică cu stropitori suspendate sau remorcate, evitând ca erbicidul să ajungă accidental pe culturi monocotiledonate de porumb, cereale păioase, etc.
- Cele mai bune rezultate se obțin prin pulverizarea buruie-

nilor în faza de creștere intensivă. Nu se recomandă utilizarea erbicidului asupra culturii în condiții de stres (ca urmare a înghețului, vânt, daune de insecte, nutriția plantelor rău, sau erbicide utilizate anterior).

- Nu este fitotoxic pentru culturile dicotiledonate dacă sunt respectate normele de aplicare.



ERBICIDE

