

 **Stroly® 50 WG**



**ФУНГИЦИД**

**ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО:** крезоксим-метил 500 г/кг

**СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ:**  
№ 20-12-17-02-0853 от 17.12.2020

**ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА:**  
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

**ТОКСИЧНОСТЬ:**  
класс опасности – IV/IV

### **МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:**

в состав фунгицида **Строли 50 ВДГ** входит действующее вещество класса стробилуринов крезоксим-метил. Крезоксим-метил ингибирует процессы митохондриального дыхания грибных клеток. После обработки действующее вещество посредством распределения в газовой фазе трансламинарно распределяется в частях растения. На растении крезоксим-метил формирует прочно связанные с поверхностью растения запасы, благодаря чему обеспечивается высокая устойчивость препарата к действию ат-

мосферных осадков. В то же время при поступлении влаги запасы крезоксим-метила постоянно высвобождаются.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Системное, защитное и лечебное действие против патогенов.
- Равномерное распределение по всей обрабатываемой площади.
- Усиливает фотосинтез.
- Эффективность действия не зависит от температурных условий.
- Возможно применение на всех фазах развития культуры.





**ПРИМЕЧАНИЕ:** Строби 50 ВДГ применяется профилактически. В рамках блоковых обработок применять максимум 2 последовательные обработки. Применение стробилуринов должны чередовать с препаратами других групп. Для высокой эффективности рекомендуем проводить комбинированную обработку Строби 50 ВДГ (с эффектом *uni-site*) + Каптон 80 ВДГ с эффектом (*multi-site*).

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура	Вредитель	Норма расхода, л/га	Срок ожидания перед сбором урожая (Максимальное количество обработок)	Срок выхода в поле для выполнения ручных (механизированных) работ
Яблоня	Парша яблони ( <i>Venturia inaequalis</i> )	0,25 - 0,3	35 (3)	7 (3)

Норма расхода рабочей жидкости: 800-1000 л/га.

- Очень высокая устойчивость к смыванию осадками.
- Очень хорошо переносится культурой (не фитотоксичен).
- Обладает также отличным антиспорообразующим действием, останавливая дальнейшее развитие болезней.
- Безопасен для пчел и энтомофагов.
- Совместим с большинством препаратов фитосанитарного использования.

#### МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **Не превышайте рекомендованные дозы.**
- Не опрыскивать в ветреную погоду или за 2-4 часа до начала дождя.
- Используйте необходимый объем жидкости, для того чтобы обеспечить однородное покрытие препаратом всей листвы.
- Избегайте точки утечки раствора.
- Применять на яблони начиная с фазы розовый бутон до начала плодоношения (плоды размером грецкого ореха).
- Убедитесь в работе смесителя в течение всего периода обработки.

