

Polimorf® 70 DF



TM

ФУНГИЦИД

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: метирам 700 г/кг

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ:
№ 22-12-22-02-1193 от 22.12.2022

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА:
водно-диспергируемые гранулы (ДФ)

ТОКСИЧНОСТЬ:
класс опасности – IV/III

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Полиморф 70 ДФ - фунгицид контактного защитного действия. Предназначен для уничтожения конидиального спороношения фитопатогенных грибов, ограничивает поражение растений. Механизм действия заключается в угнетении жизнедеятельности спор грибов на поверхности вегетирующих органов. Действующее вещество блокирует активность ферментов грибов. Поэтому препарат целесообразно применять непосредственно перед поражением растений возбудителем или сразу после него.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Средство эффективно для профилактики микозных поражений на различных сельскохозяйственных растениях.
- Не оказывает токсического влияния на обрабатываемые культурные растения.
- Можно применять на всех фазах развития культуры.
- Удобен и прост в применении: гранулы быстро диспергируются в воде, их легко дозировать, и они не образуют пыли.
- Благодаря подавлению ферментной системы грибов, вероятность их



адаптации к действию фунгицида мала.

- Подходит для многих культур.
- Имеет быстрое начальное действие.
- Мало опасен для пчел, практически не опасен для полезных насекомых.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Полиморф 70 ДФ совместим в баковой смеси с большинством фунгицидов и инсектицидов. Нельзя применять его

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:


Культура	Вредитель	Норма расхода, кг/га	Срок ожидания перед сбором урожая (Максимальное количество обработок)	Срок выхода в поле для выполнения ручных (механизированных) работ
Яблоня	Парша яблони (<i>Venturia inaequalis</i>)	2,0 - 2,5	30 (2-3)	7 (3)
Слива	Клястероспориоз (<i>Clasterosporium carpophilum</i>) Красная пятнистость (<i>Polystigma rubrum</i>) Ржавчина (<i>Tranzschelia pruni spinosae</i>)		28 (2)	

Норма расхода рабочей жидкости: 1000-1500 л/га.

совместно с кислыми или сильнощелочными продуктами. Перед замешиванием бакового раствора следует проверить каждый препарат на совместимость с фунгицидом Полиморф 70 ДФ. Если на дно выпал осадок, данные вещества смешивать нельзя.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **Не превышайте рекомендованные дозы.**
- Обеспечить равномерное покрытие растений.
- Не применять в ветреную погоду или за 4-6 часов до начала дождя.
- Используется в комбинации с системными фунгицидами, что позволяет контролировать весь спектр заболеваний.
- Превосходно работает в борьбе с паршой яблони с самого начала вегетации, надежно защищая растения вплоть до начала созревания плодов. Для предотвращения развития ранней инфекции первое опрыскивание проводят уже в фазу зеленого конуса. Последующие об-



работки проводятся с интервалом 7-10 дней. Фунгицид применяется при температуре более +5°C для достижения максимальной эффективности.



ФУНГИЦИДЫ

