

**Miuris® 125 EC**



**ГЕРБИЦИД**

**ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО:** хизалофоп-П-этил 125 г/л

**СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ:**  
№ 23-11-28-03-1461 от 28.11.2023

**ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА:**  
концентрат эмульсии (КЭ)

**ТОКСИЧНОСТЬ:**  
класс опасности – IV/IV

### **МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:**

**Миурис 125 КЭ** является гербицидом системного селективного действия. Действующее вещество гербицида быстро впитывается листьями и другими надземными частями однолетних сорняков. Затем переносится во все точки интенсивного роста, включая корни и корневище, где уничтожает липиды меристематических клеток. Не проникает в почву и не оказывает влияния на сорняки, появившиеся после обработки.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- **Миурис 125 КЭ** является селективным для широколистных культур.
- Не существует ограничений относительно этапов развития культур во время нанесения препарата.

- Высокая эффективность против падалицы зерновых колосовых.
- Защита длится до окончания вегетационного периода.

### **БЫСТРОТА ВОЗДЕЙСТВИЯ:**

- Первые признаки действия гербицида появляются на 7-10 день после обработке. Обработанные сорняки прекращают рост, молодые листья желтеют. Полное уничтожение появляется на 1-3 неделю после обработки, в зависимости от типа сорняка и климатических условий. Культивацию необходимо избегать в период 2-3 недель после обработки.
- Осадки, выпавшие в течение 2 часов после обработки, снижают эффективность гербицида.



### **ВНИМАНИЕ!**

*Не рекомендуется использовать в баковых смесях с противододольными гербицидами на соответствующих культурах.*

#### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:**

Культура	Вредитель	Норма расхода, л/га	Срок ожидания перед сбором урожая (Максимальное количество обработок)	Срок выхода в поле для выполнения ручных (механизированных) работ
Подсолнечник	Однодольные однолетние сорняки	0,6	- (1)	7 (3)
	Однолетние и многолетние однодольные сорняки	1,2		
Соя	Однодольные однолетние сорняки	0,6	- (1)	7 (3)
	Однолетние и многолетние однодольные сорняки	1,0		
Рапс	Однодольные однолетние сорняки	0,6	- (1)	- (3)
	Однолетние и многолетние однодольные сорняки	1,0		

Норма расхода рабочего раствора: 200-400 л/га.

#### **МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:**

- **Не превышайте рекомендованные дозы.**
- Опрыскивается подвешенными или прицепными опрыскивателями, избегая случайного попадания гербицида на однодольные культуры, кукурузу, колосовые зерновые культуры и т.д.
- Самые лучшие результаты, получаются путем опрыскивания в фазе

интенсивного роста сорняков. Не рекомендуется использование гербицида для культур, находящихся в состоянии стресса (вследствие заморозков, ветра, вреда нанесенного насекомыми, плохого питания растений, или же вследствие опрыскивания иными гербицидами).

- Не является фитотоксичным для двудольных растений, если соблюдены нормы расхода.

