

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ:
№: 17-12-22-02-0237 от 22.12.2017

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА:
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

ТОКСИЧНОСТЬ:
класс опасности – III/III

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Препарат впитывается надземными частями растения и распределяется акропетально во внутренние ткани, где блокирует распространение гриба путем подавления процесса синтеза эргостерола, что приводит к невозможности гриба формировать клеточную стенку.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Системный фунгицид защитного, лечебного и эрадикационного действия.
- После попадания в растение, переносится по ксилеме к зеленым органам растения, включая отростки, появившиеся после обработки.
- Может наноситься на всех фазах развития растения, в экстремальных условиях, даже во время цветения, не нанося вреда опылению и качеству фруктов.
- Устойчив к атмосферным осадкам.
- Выраженный «стоп-эффект».
- Широкий спектр воздействия и высокая биологическая эффективность.
- Безопасен для пчел.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Препарат может быть использован в сочетании с большинством фунгици-



дов, инсектицидов, листовых подкормок, за исключением оказывающих щелочное и окислительное действие. В целях безопасности тестируйте препараты на совместимость перед применением.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **Не превышайте рекомендованные дозы.**
- Использовать необходимый объем жидкости, для того чтобы обеспечить равномерное покрытие всех органов растений (особенно нижняя часть листа и грозди).
- Производится профилактическая обработка или при появлении первых признаков заражения, интервал между обработками 7-10 дней.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура	Вредитель	Норма расхода, кг/га	Срок ожидания перед сбором урожая (Максимальное количество обработок)	Срок выхода в поле для выполнения ручных (механизированных) работ
Яблоня	Мучнистая роса	0,25 - 0,3	35 (2-3)	7 (3)
Виноград	Оидиум			
Слива	Клястероспориоз Красная пятнистость сливы Монолоиз			
Черешня, вишня	Клястероспориоз Кокомикоз Монилиоз	0,3 - 0,4	20 (2-3)	- (3)
Пшеница	Гельминтоспориоз Мучнистая роса		35 (1)	
Рапс	Альтернариоз Фомоз Белая гниль	0,3 - 0,4	56 (1-2)	- (3)
Персик, Абрикос	Клястероспориоз Мучнистая роса			
			*В процессе регистраций	

Норма расхода рабочей жидкости: сады: 800-1500 л/га;
виноград: 600-800 л/га;
пшеница, рапс: 200-400 л/га.



ФУНГИЦИДЫ

