

# Flint Stars® SC



FUNGICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: pirimetanil 400 g/l  
+ trifloxistrobin 120 g/l

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:  
Nr. 20-12-17-02-0856 din 17.12.2020

FORMA PREPARATIVĂ:  
suspensie concentrată (SC)

TOXICITATE:  
clasa de pericolozitate – III/IV

## MECANISMUL DE ACȚIUNE:

**Flint Stars SC** este un fungicid cu acțiune sistemică, complex, care conține două substanțe active: pirimetanil și trifloxistrobin, cu mecanisme de acțiune diferite.

**Pirimetanil** - care acționează prin inhibarea capacitatei ciupercii de a produce enzime necesare procesului de infecție. Drept urmare are loc stoparea creșterii tubului de germinație și a miceliului.

**Trifloxistrobin** - substanța activă mesosistemnică ce se caracterizează printr-o aderență foarte bună cu stratul ceros al frunzei, urmat de redistribuirea prin faza de va-

pori și redepunerea pe organele verzi noi formate. Ciclul de dezvoltare a ciupercilor este întrerupt încă din stadiile primare prin inhibarea germinației sporilor.

## AVANTAJE:

- Fungicid sistemic, mezostemic combinat din două substanțe active cu un spectru larg de acțiune.
- Eficiență excepțională datorită a două mecanisme diferite de acțiune complementare una cu alta.
- Efect protector, curativ și anti-sporulant.
- Rezistență la ploaie și performanță la temperaturi scăzute.
- Redistribuirea completă a fungicidului prin acțiune sistemică și faza gazoasă.
- Excelent pentru utilizare în programe anti-rezistență.
- Aplicare flexibilă cu posibilitatea de a prelungi intervalul dintre tratamente.
- Inofensiv pentru albi și fauna utilă.





## FUNGICIDE



### RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Făinarea mărului Rapănul mărului	0,5 - 0,7	35 (2-3)	7 (3)

Norma de consum a soluției de lucru: 800-1000 l/ha.

### COMPATIBILITATEA:

**Flint Stars SC** este compatibil cu majoritatea fungicidelor și insecticidelor. Nu utilizați fungicidul în amestec cu produse care conțin aluminiu. Pentru siguranță, în fiecare caz se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate.

- Asigurați funcționarea agitatorului pe toată durata tratamentului.



### TEHNICA DE APLICARE:

- Nu depășiți dozele recomandate.
- Nu pulverizați în condiții de vânt sau înainte de 2-4 ore de ploaie.
- Aplicați un volum necesar de soluție, astfel încât să asigurați o acoperire uniformă a întregului foliaj.
- Evitați punctul de scurgere al soluției.

