



Piromait 50 SC



ACARICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: fenpiroximat 50 g/l

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 25-11-21-01-2013 din 21.11.2025

FORMA PREPARATIVĂ:

suspensie concentrată (SC)

TOXICITATE:

clasa de pericolozitate – III/III

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Piromait 50 SC este un acaricid, pe bază de fenpiroximat, aparținând familiei fenoxipirazolilor, cu acțiune de contact și ingestie asupra dăunătorului. Fenpiroximat-ul inhibă transferul de electroni din mitocondrii și afectează sistemul respirator al acarianului. În final se produce moartea acarienilor. Este deosebit de potrivit pentru controlul acarienilor păianjenul roșu și al acarienilor eriofizi în numeroase culturi (măr, prun, cireș și viță de vie).

PROPRIETĂȚI:

Fenpiroximat-ul oferă o inhibare rapidă, un control de lungă durată și inhibă depunerea ouălor de către acarienii femele.

AVANTAJE:

- Acțiune de contact și indigestie asigură o protecție excelentă a culturii.
- Activ împotriva tuturor formelor mobile (larve, nimfe și adulți).
- Acțiune de șoc asupra adulților, larvelor și nimfelor, la o zi după

tratament, acarieni nu se mai hrănesc și nu mai produc pagube.

- Eficient și de lungă durată (21-28 zile) la doza recomandată pentru cultura țintă.
- Nu are rezistență încrucișată cu alte acaricide convenționale.
- Rezistență excelentă la spălare și la temperaturi ridicate.
- Prietenos cu insectele benefice, se încadrează în programul de combatere integrat al dăunătorilor (IPM - Integrated Pest Management).





COMPATIBILITATE:

Conform recomandărilor producătorului, **Piromait 50 SC**, poate fi amestecat cu cele mai utilizate pesticide și îngrășăminte foliare. Înainte de utilizare a unui amestec, se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate în prealabil și un test preliminar pe câteva plante înainte de a se face aplicații la scară largă. Nu se amestecă cu sulfat de cupru și zeamă bordoleză.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Acarianul păducelului Acarianul roșu al pomilor	1,0 - 1,5	21 (1)	7 (3)
Cireș	Acarieni		21 (1)	
Prun			14 (1)	
Vița de vie	Acarianul roșu comun		35 (1)	

Norma de consum a soluției de lucru: măr, prun, cireș: 1000-1500 l/ha;
vița de vie: 600-800 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt.
- Perioada optimă de aplicare este atunci când populația de acarieni începe să crească, iar aplicarea preventivă este cea mai eficientă și cu un efect de lungă durată.
- Deoarece este un produs de contact, pentru a asigura o eficacitate bună, umeziți bine și uniform toată vegetația, inclusiv partea inferioară a frunzelor și a părților mai puțin expuse ale butucilor de viță de vie.
- Utilizarea **Piromait 50 SC**, alternând cu acaricide cu diferite mecanisme de acțiune, reduce dezvoltarea rezistenței.