

Efalin[®] 80 WP



FUNGICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: fosetil de aluminiu 800 g/kg

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 17-12-22-02-0224 din 22.12.2017

FORMA PREPARATIVĂ:

pulbere umectabilă (WP)

TOXICITATE:

clasa de pericolozitate – IV/IV

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Efalin 80 WP are acțiune preventivă și curativă prin inhibarea germinației sporilor și de blocare a dezvoltării miceliului în plantă.

PROPRIETĂȚI:

- Prezintă o proprietate unică de stimulare a sistemelor de auto-apărare a plantelor și nu dezvoltă fenomen de rezistență.
- Manifestă acțiune sistemică și translaminară în plantă.
- Are acțiune preventivă și curativă asupra patogenilor.
- Produsul se remarcă printr-o

mobilitate foarte mare în toate țesuturile plantei.

AVANTAJE:

- Foarte bine tolerat de culturile agricole în diferite faze de dezvoltare și poate fi utilizat și în timpul înfloririi.
- Odată pătruns în plantă, se distribuie ascendent și descendent permițând astfel protejarea organelor vegetative și fructifere într-o perioadă lungă de timp.
- Intensifică imunitatea plantelor împotriva pătrunderii infecției în celule.



ATENȚIE! Incompatibil cu îngrășămintele foliare care conțin azot și nutrienți pentru plante, cât și cu produsele pe bază de cupru, dicofol și pirimetanil. Efalin WP 80 nu trebuie amestecat sau aplicat cu formulări uleioase și substanțe tensioactive. Formarea unui strat de ulei pe frunziș, împiedică pătrunderea acestuia în plantă. Pentru o mai mare siguranță testați compatibilitatea și fitotoxicitatea produselor înainte de utilizare.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapănul mărului Focul bacterian Fitoftoriza, bacterioze	5,0	30 (2)	7 (3)
Vița de vie	Mana	3,0 - 3,5	30 (3)	

Norma de consum a soluției de lucru: măr: 800-1000 l/ha;
vița de vie: 600-800 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- Nu depășiți dozele recomandate.
- Nu pulverizați în condiții de vânt.
- Oferiți o bună acoperire a plantelor.
- Momentul optim de aplicare al acestui fungicid la măr, pentru combaterea focului bacterian al rozaceelor, este în fenofaza buton roz - începutul înfloritului până la scuturarea petalelor, pentru a preveni infecția care are loc prin stigmatul florii.
- De utilizat volumul de soluție maximal și doza maximă a preparatului.



FUNGICIDE