

FUNGICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: kresoxim-metil 500 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ:

granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE:

clasa de periculozitate – IV/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:

Nr. 20-12-17-02-0853 din 17.12.2020

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Stroly 50 WG este un fungicid sistemic pe bază de kresoxim-metil, din familia strobilurinelor. Substanța activă, kresoxim-metil, este absorbită de suprafața foliară și translocată prin xilem în tot corpul plantei. Kresoxim-metil-ul inhibă respirația mitocondrială a fungilor, germinația sporilor, creșterea miceliului și producerea sporilor.

AVANTAJE:

- Acțiune sistemică, preventivă și curativă contra patogenilor.
- Distribuție uniformă pe toată suprafața.
- Intensifică fotosinteza (green effect).
- Substanța activă rămâne după aplicare la suprafața frunzelor ca un depozit solid, particulele fiind absorbite în stratul subcuticular.





NOTĂ: *Stroly 50 WG se aplică preventiv. În cadrul tratamentelor în bloc se aplică maxim 2 stropiri consecutive. Aplicarea strobilurinelor trebuie să alterneze cu stropiri cu produse din alte grupe. Pentru o eficacitate mai bună se recomandă de a aplica un tratament combinat Stroly 50 WG (cu efect uni-site) + Kapton 80 WG (cu efect multi-site).*

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapăn	0,25 - 0,3	35 (3)	7 (3)

Norma de consum a soluției de lucru: 800-1000 l/ha.

- Eliberarea substanței active se face treptat, fapt ce conferă o lungă perioadă de acțiune.
- Poate fi aplicat fără riscuri de fitotoxicitate, având o selectivitate excelentă.
- Inofensiv pentru albiși și entomofauna utilă.
- Compatibil cu majoritatea fungicidelor, insecticidelor și cu fertilizanții.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt sau înainte de 2-4 ore de ploaie.
- Se va asigura o pulverizare fină și uniformă a foliajului până la punctul de scurgere a soluției.
- Se aplică la măr începând cu fenofaza de buton roz, până la începutul fructificării (fructe de mărimea nucilor).
- Asigurați funcționarea agitatului pe toată durata tratamentului.



FUNGICIDE