

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ:
№ 20-06-11-01-0695 от 11.06.2020

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Зенин 25 КС - это пиретроидный инсектицид, с сильно контактным и кишечным действием против широкого диапазона вредителей. После обработки активное вещество быстро проникает в кутикулу насекомого воздействуя на нервную систему, вредитель прекращает питаться, и умирает.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Выраженное кишечное и контактное воздействие на вредителей.
- Действует быстро, тотально и необратимо.
- Не фитотоксичен в рекомендованных дозах на зарегистрированных культурах.
- Используется в маленьких дозах.
- Совместим с большинством зарегистрированных препаратов для данной культуре.
- Нон-системик инсектицид, с хорошим резидуальным действием на обрабатываемую поверхность.
- Препарат обладает максимальной устойчивостью к действию ультрафиолетовых лучей и осадков с условием, что раствор успел высохнуть до того, как начался дождь.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

При высоких температурах, применение избегается в течение дня, тогда вреди-

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА:
концентрат суспензии (КС)

ТОКСИЧНОСТЬ:
класс опасности – III/I

тели мало подвержены и интенсивная фото деградация.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **Не превышайте рекомендованные дозы.**
- Не применяйте в ветреную погоду.
- Обработка не производится в условиях термического стресса.
- Препарат применяется путем опрыскивания необходимым объемом жидкости таким образом, чтобы обеспечить полное и равномерное смачивание всей поверхности растений, а также предотвращать стекание рабочего раствора.



ВНИМАНИЕ! Обязательно соблюдение мер защиты пчел и зоофагов. Для того чтобы защитить пчелы и других насекомых для опыления не обрабатывать во время цветения. Не опрыскивать, когда пчелы активны.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га	Срок ожидания перед сбором урожая (Максимальное количество обработок)	Срок выхода в поле для выполнения ручных (механизированных) работ
Яблоня	Яблонная плодожорка (<i>Cydia pomonella</i>) Листовертки (<i>Tortricidae spp</i>) Яблонный пилильщик (<i>Hoplocampa testudinea</i>)	0,2 - 0,25	20 (1-2)	10 (4)
Рапс	Рапсовый пилильщик (<i>Athalia rosae</i>) Капустная тля (<i>Brevicoryne brassicae</i>) Рапсовый цветоед (<i>Meligethes aeneus</i>)	0,08 - 0,1	30 (1-2)	- (3)
Слива	Сливовая плодожорка (<i>Cydia funebrana</i>) Желтый сливовый пилильщик (<i>Hoplocampa flava</i>) Сливовая толстоножка (<i>Eurytoma schreineri</i>)		*В процессе регистраций	

Норма расхода рабочей жидкости: яблоня, слива: 1000-1500 л/га;
рапс: 200-400 л/га.

