

FUNGICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: ditianon 700 g/kg

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 17-12-22-02-0223 din 22.12.2017

FORMA PREPARATIVĂ:

granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE:

clasa de periculozitate – IV/IV

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Delin 70 WG este fungicid cu acțiune de contact și preventivă. Perturbează sporii agentilor patogeni la etapa de germinare.

PROPRIETĂȚI:

- Fungicid cu efect multi-site în combaterea superioară a rapă-nului la măr.
- Substanța activă ditianon are efect preventiv fiind una dintre cele mai active substanțe din categoria fungicidelor de contact.

AVANTAJE:

- Asigură o calitate înaltă a produsului finit și păstrării lui.
- Posibilitatea de aplicare în toate fazele de dezvoltare a culturii.
- Nu este fitotoxic la culturile tratate.
- Risc redus de rezistență.
- Substanța activă ditianon în apă nu se dizolvă complet, o parte a substanței active la prezența picăturilor de apă(ploaie, ceată, rouă) continuă să se dizolve și

astfel se lungește acțiunea preparatului.

- După prelucrare pe plante se formează o pătură impermeabilă care împiedică pătrunderea infecției în plante.
- Manifestă un bun efect curativ în tratarea leziunilor mecanice provocate de precipitațiile cu grindină, prin aplicarea a două tratamente consecutive cu concentrația de 0.1% a fungicidului la un interval de 7 zile.
- Inofensiv pentru albi și entomofagi.





ATENȚIE! Nu se va amesteca în soluția de lucru, preparate cu reacție alcalină (spre ex.: zeamă bordeleză) și cele cu conținut de ulei!

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapănul mărului (<i>Venturia inaequalis</i>)	0,7 - 1,0	30 (2-3)	7 (3)

Norma de consum a soluției de lucru: 800-1000 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- Nu depășiți dozele recomandate.
- Nu pulverizați în condiții de vânt.
- De folosit un volum necesar de soluție, astfel încât să se asigure o acoperire uniformă a întregului foliaj, dar nu mai mult de punctul de scurgere al soluției de lucru.
- Intervalul între tratamente 7-10 zile, în cazul căderii precipitațiilor mai mult de 25 mm, intervalul între tratamente se micșorează.

